

Schema di preparazione standard con PEG 4000

1. Nei tre giorni precedenti l'esame non assumere fibre (verdure, legumi, frutta, piccoli semi ecc)
2. Assumere Soluzione Elettrolitica di Lavaggio Gastrointestinale (SELG ESSE 1000 – ISOCOLAN ecc)

Come:

- diluire la soluzione in 4 litri di acqua liscia ed iniziare a bere un quarto di litro ogni quarto d'ora (1 litro/ora)

Quando:

- Se la colonscopia viene effettuata di **mattina** assumere **la sera precedente, iniziando dopo 6 ore dall'ultimo pasto (pranzo)**.
- Se la colonscopia viene effettuata di **pomeriggio** assumere PEG **la mattina a digiuno**.



**DOMUS
GRATIAE**
centro diagnostico

TERNI / via Ippocrate, 164
tel. 0744.221025
prenotazioni@cidatsanita.it



MURRI
diagnostica
fisio kinesiterapia

TERNI / via Italo Calvino, 6
tel. 0744.427262
diagnosticamurri@gmail.com



**ORVIETO
DIAGNOSTICA**
centro medico polispecialistico

ORVIETO / via dell'Innovazione, 1A
tel. 0763.32521
orvietodiagnostica@cidatsanita.it



**CENTRO
ATTIVITÀ
MOTORIE**

fisioterapia – diagnostica
visite specialistiche

TERNI / Via del Modulo, 6
tel. 0744.304590
prenotazioni@centroattivitaemotorie3.it



**CENTRO
MEDICO
VALNERINA**

fisioterapia – diagnostica
visite specialistiche

ARRONE / Via Rimembranze, 59
tel. 0744.388626
centromedicovalnerina@cidatsanita.it

N.B. Se il paziente non è in grado di assumere la soluzione in una unica somministrazione suddividerla in due parti:

- Litri in 2 ore la sera precedente (iniziando 6 ore dopo l'ultimo pasto) non assumere cibi sino a preparazione finita
- Litri in 2 ore al mattino a digiuno
- Assumere cibi come di seguito al punto 3

3. Ultimata la preparazione (due ore dopo l'assunzione dell'ultima dose circa) si può assumere un pasto leggero: **thè con biscotti o minestrina.**

Mantenere il digiuno solo per gli esami operativi (polipectomia).

Controindicazioni:

Ipersensibilità verso uno dei componenti del prodotto, forme occlusive o stenotiche dell'intestino, stasi gastrica, ileo dinamico, perforazioni gastrointestinali, coliti acute, megacolon tossico, bambini fino a 20 kg di peso.

*Sospendere l'assunzione in caso di vomito o di ipotensione ed attenersi sempre alle norme esplicative riportate nella confezione del prodotto. Contattare in seguito il **Servizio di Endoscopia Digestiva** per programmare eventuale preparazione alternativa.*



**DOMUS
GRATIAE**
centro diagnostico

TERNI / via Ippocrate, 164
tel. 0744.221025
prenotazioni@cidatsanita.it



MURRI
diagnostica
fisio kinesiterapia

TERNI / via Italo Calvino, 6
tel. 0744.427262
diagnosticamurri@gmail.com



**ORVIETO
DIAGNOSTICA**
centro medico polispecialistico

ORVIETO / via dell'Innovazione, 1A
tel. 0763.32521
orvietodiagnostica@cidatsanita.it



**CENTRO
ATTIVITÀ
MOTORIE**

fisioterapia – diagnostica
visite specialistiche

TERNI / Via del Modulo, 6
tel. 0744.304590
prenotazioni@centroattivitaemotorie3.it



**CENTRO
MEDICO
VALNERINA**

fisioterapia – diagnostica
visite specialistiche

ARRONE / Via Rimembranze, 59
tel. 0744.388626
centromedicovalnerina@cidatsanita.it