

PLENVU, polvere per soluzione orale

Macrogol 3350, sodio ascorbato, sodio solfato anidro, acido ascorbico, sodio cloruro e potassio cloruro

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Plenvu e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Plenvu
3. Come prendere Plenvu
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Plenvu
6. Contenuto della confezione e altre informazioni



**DOMUS
GRATIAE**
centro diagnostico
TERNI / via Ippocrate, 164
tel. 0744.221025
prenotazioni@cidatsanita.it



MURRI
diagnostica
fisio/inesiterapia
TERNI / via Italo Calvino, 6
tel. 0744.427262
diagnosticamurri@gmail.com



**ORVIETO
DIAGNOSTICA**
centro medico polispecialistico
ORVIETO / via dell'Innovazione, 1A
tel. 0763.32521
orvietodiagnostica@cidatsanita.it



**CENTRO
ATTIVITÀ
MOTORIE**
fisioterapia – diagnostica
visite specialistiche
TERNI / Via del Modulo, 6
tel. 0744.304590
prenotazioni@centroattivitaemotorie3.it



**CENTRO
MEDICO
VALNERINA**
fisioterapia – diagnostica
visite specialistiche
ARRONE / Via Rimembranze, 59
tel. 0744.388626
centromedicovalnerina@cidatsanita.it

1. Che cos'è Plenvu e a cosa serve

Plenvu contiene la combinazione delle sostanze attive macrogol 3350, sodio ascorbato, sodio solfato anidro, acido ascorbico, sodio cloruro e potassio cloruro.

Plenvu è un lassativo.

Plenvu è indicato negli adulti dai 18 anni in preparazione di esami clinici che richiedono un intestino pulito.

Plenvu pulisce l'intestino provocando diarrea.

2. Cosa deve sapere prima di prendere Plenvu

Non prenda Plenvu:

- se è allergico (ipersensibile) ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6)
- se ha un blocco intestinale (ostruzione intestinale)
- se ha un foro nella parete dello stomaco o dell'intestino (perforazione intestinale)
- se ha una paralisi intestinale (ileo)
- se manifesta problemi con lo svuotamento dello stomaco da cibo e liquidi (ad es. paresi gastrica, ritenzione gastrica)
- se soffre di fenilchetonuria. Si tratta di un'incapacità ereditaria del corpo ad utilizzare un particolare amminoacido. Plenvu contiene una fonte di fenilalanina.
- se il suo corpo non è in grado di produrre una quantità sufficiente di glucosio-6-fosfato deidrogenasi
- se ha un intestino molto dilatato (megacolon tossico)



**DOMUS
GRATIAE**
centro diagnostico

TERNI / via Ippocrate, 164
tel. 0744.221025
prenotazioni@cidatsanita.it



MURRI
diagnostica
fisio⁺kinesiterapia

TERNI / via Italo Calvino, 6
tel. 0744.427262
diagnosticamurri@gmail.com



**ORVIETO
DIAGNOSTICA**
centro medico polispecialistico

ORVIETO / via dell'Innovazione, 1A
tel. 0763.32521
orvietodiagnostica@cidatsanita.it



**CENTRO
ATTIVITÀ
MOTORIE**

fisioterapia – diagnostica
visite specialistiche
TERNI / Via del Modulo, 6
tel. 0744.304590
prenotazioni@centroattivitaemotorie3.it



**CENTRO
MEDICO
VALNERINA**

fisioterapia – diagnostica
visite specialistiche
ARRONE / Via Rimembranze, 59
tel. 0744.388626
centromedicovalnerina@cidatsanita.it

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere prima di prendere Plenvu, se rientra in una delle seguenti situazioni:

- ha problemi cardiaci e/o problemi del ritmo cardiaco
- ha problemi renali e/o disidratazione
- ha problemi allo stomaco o all'intestino, inclusa infiammazione intestinale
- ha problemi nella deglutizione
- ha un livello di sali nel sangue alto o basso (ad es. sodio, potassio)
- ha altre patologie mediche (ad es. crisi convulsive)

Non somministrare Plenvu in assenza di supervisione medica, a pazienti in stato di coscienza alterata.

Se si trova in scarse condizioni di salute o presenta una condizione medica grave, deve essere particolarmente consapevole dei possibili effetti indesiderati elencati al paragrafo

4. In caso di dubbi si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere.

Bambini e adolescenti

L'uso di Plenvu non è raccomandato nei bambini al di sotto dei 18 anni di età.

Altri medicinali e Plenvu

Informi il medico, il farmacista o l'infermiere se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale (inclusi contraccettivi orali).

I medicinali assunti per via orale possono non essere assorbiti correttamente, se presi nell'ora antecedente l'inizio dell'assunzione di Plenvu.



**DOMUS
GRATIAE**
centro diagnostico
TERNI / via Ippocrate, 164
tel. 0744.221025
prenotazioni@cidatsanita.it



MURRI
diagnostica
fisio<inesiterapia
TERNI / via Italo Calvino, 6
tel. 0744.427262
diagnosticamurri@gmail.com



**ORVIETO
DIAGNOSTICA**
centro medico polispecialistico
ORVIETO / via dell'Innovazione, 1A
tel. 0763.32521
orvietodiagnostica@cidatsanita.it



**CENTRO
ATTIVITÀ
MOTORIE**
fisioterapia – diagnostica
visite specialistiche
TERNI / Via del Modulo, 6
tel. 0744.304590
prenotazioni@centroattivitaemotorie3.it



**CENTRO
MEDICO
VALNERINA**
fisioterapia – diagnostica
visite specialistiche
ARRONE / Via Rimembranze, 59
tel. 0744.388626
centromedicovalnerina@cidatsanita.it

Se si assumono contraccettivi orali possono rendersi necessarie forme supplementari di contraccezione (ad es. profilattico) per evitare gravidanze.

Plenvu con cibi e bevande

Il giorno precedente l'esame clinico può consumare una leggera colazione seguita da un pasto leggero.

Per lo **schema di dosaggio suddiviso in due giorni**, OPPURE per lo **schema di dosaggio in un unico giorno il giorno precedente**, deve completare il pasto almeno 3 ore prima di iniziare a prendere Plenvu, dopo di che potrà consumare esclusivamente liquidi chiari.

Per lo **schema di dosaggio in un unico giorno, al mattino**, potrà assumere brodo e/o yogurt al naturale per cena (da terminare entro le ore 20 circa). Dal termine della cena della sera precedente l'esame clinico, potrà consumare esclusivamente liquidi chiari.

Nota: per informazioni sugli schemi di dosaggio, fare riferimento al paragrafo 3.

Non è consentita la colazione la mattina dell'esame clinico.

Continuare a bere liquidi *chiari* prima, durante e dopo l'assunzione di Plenvu per prevenire la perdita di liquidi (disidratazione). È importante bere la quantità supplementare prescritta di liquidi chiari.

Esempi di liquidi chiari sono acqua, brodo, tisana, tè nero o caffè (senza latte), bevande analcoliche/sciroppi diluiti e succhi di frutta chiari (senza polpa).

Importante:

- **Non bere alcool, latte, nulla di colore rosso o viola (ad es. succo di ribes nero) o qualunque altra bevanda che contenga polpa.**
- **Non mangiare durante l'assunzione di Plenvu e fino al termine dell'esame clinico.** L'assunzione di tutti i liquidi deve essere terminata almeno:
 - due ore prima dell'inizio dell'esame clinico, quando eseguito in anestesia generale, oppure
 - un'ora prima dell'inizio dell'esame clinico, senza anestesia generale.



**DOMUS
GRATIAE**
centro diagnostico
TERNI / via Ippocrate, 164
tel. 0744.221025
prenotazioni@cidatsanita.it



MURRI
diagnostica
fisio<inesiterapia
TERNI / via Italo Calvino, 6
tel. 0744.427262
diagnosticamurri@gmail.com



**ORVIETO
DIAGNOSTICA**
centro medico polispecialistico
ORVIETO / via dell'Innovazione, 1A
tel. 0763.32521
orvietodiagnostica@cidatsanita.it



**CENTRO
ATTIVITÀ
MOTORIE**
fisioterapia – diagnostica
visite specialistiche
TERNI / Via del Modulo, 6
tel. 0744.304590
prenotazioni@centroattivitaemotorie3.it



**CENTRO
MEDICO
VALNERINA**
fisioterapia – diagnostica
visite specialistiche
ARRONE / Via Rimembranze, 59
tel. 0744.388626
centromedicovalnerina@cidatsanita.it

Gravidanza, allattamento e fertilità

Non esistono dati relativi all'uso di Plenvu durante la gravidanza o l'allattamento, pertanto il suo utilizzo non è raccomandato. Deve essere utilizzato solo se ritenuto essenziale dal medico. Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico, al farmacista o all'infermiere prima di prendere Plenvu.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Plenvu non altera la capacità di guidare veicoli o di utilizzare macchinari.

Plenvu contiene sodio, potassio e una fonte di fenilalanina

Questo medicinale contiene 458,5 mmol (10,5 g) di sodio per ciclo di trattamento. Da tenere in considerazione in persone che seguono una dieta a basso contenuto di sodio.

Questo medicinale contiene 29,4 mmol (1,1 g) di potassio per ciclo di trattamento. Da tenere in considerazione in persone con ridotta funzionalità renale o che seguono una dieta a basso contenuto di potassio.

Plenvu contiene una fonte di fenilalanina che può essere dannosa per le persone affette da fenilchetonuria. Contiene inoltre ascorbato che può essere dannoso per le persone con carenza di glucosio-6-fosfato deidrogenasi.



**DOMUS
GRATIAE**
centro diagnostico

TERNI / via Ippocrate, 164
tel. 0744.221025
prenotazioni@cidatsanita.it



MURRI
diagnostica
fisio kinesiterapia

TERNI / via Italo Calvino, 6
tel. 0744.427262
diagnosticamurri@gmail.com



**ORVIETO
DIAGNOSTICA**
centro medico polispecialistico

ORVIETO / via dell'Innovazione, 1A
tel. 0763.32521
orvietodiagnostica@cidatsanita.it



**CENTRO
ATTIVITÀ
MOTORIE**

fisioterapia – diagnostica
visite specialistiche
TERNI / Via del Modulo, 6
tel. 0744.304590
prenotazioni@centroattivitaemotorie3.it



**CENTRO
MEDICO
VALNERINA**

fisioterapia – diagnostica
visite specialistiche
ARRONE / Via Rimembranze, 59
tel. 0744.388626
centromedicovalnerina@cidatsanita.it

3. Come prendere Plenvu

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi, consulti il medico, il farmacista o l'infermiere.

Prima di prendere Plenvu, legga attentamente le seguenti istruzioni. Lei deve sapere:

- Quando prendere Plenvu
- Come preparare Plenvu
- Come bere Plenvu
- Che cosa si deve aspettare che accada

Quando prendere Plenvu

Il trattamento con Plenvu deve essere completato prima dell'esame clinico.

Il ciclo di trattamento può essere assunto in dosi suddivise come descritto di seguito:

Schema di dosaggio suddiviso in due giorni

Dose 1 presa la sera precedente l'esame clinico (alle ore 18 circa) e Dose 2 il mattino presto del giorno dell'esame clinico (alle ore 6 circa), **oppure**

Schema di dosaggio in un unico giorno, al mattino

Dose 1 e Dose 2 prese la mattina del giorno dell'esame clinico (Dose 1 alle ore 5 circa); le due dosi separate da un intervallo minimo di 1 ora, **oppure**



**DOMUS
GRATIAE**
centro diagnostico

TERNI / via Ippocrate, 164
tel. 0744.221025
prenotazioni@cidatsanita.it



MURRI
diagnostica
fisio/inesiterapia

TERNI / via Italo Giauro, 6
tel. 0744.427262
diagnosticamurri@gmail.com



**ORVIETO
DIAGNOSTICA**
centro medico polispecialistico

ORVIETO / via dell'Innovazione, 1A
tel. 0763.32521
orvietodiagnostica@cidatsanita.it



**CENTRO
ATTIVITÀ
MOTORIE**

fisioterapia – diagnostica
visite specialistiche
TERNI / Via del Modulo, 6
tel. 0744.304590
prenotazioni@centroattivitaemotorie3.it



**CENTRO
MEDICO
VALNERINA**

fisioterapia – diagnostica
visite specialistiche
ARRONE / Via Rimembranze, 59
tel. 0744.388626
centromedicovalnerina@cidatsanita.it

Schema di dosaggio in un unico giorno, il giorno precedente

Dose 1 e Dose 2 prese la sera del giorno precedente l'esame clinico (Dose 1 alle ore 18 circa); le due dosi separate da un intervallo minimo di 1 ora.

Il medico le dirà quale schema di dosaggio seguire. **NON** aggiungere alcun altro ingrediente alle dosi.

Non mangiare durante l'assunzione di Plenvu e fino al termine dell'esame clinico.

Per informazioni riguardo l'orario dei pasti prima di prendere Plenvu fare riferimento al paragrafo 2.

Come preparare Plenvu Dose 1

1. Aprire la scatola ed estrarre la bustina Dose 1.
2. Versare il contenuto della Dose 1 in un recipiente graduato che possa contenere 500 ml di liquido.
3. Aggiungere acqua fino a raggiungere 500 ml e mescolare fino a che tutta la polvere sia disciolta. Questa operazione può richiedere fino a circa 8 minuti.

Come bere la Dose 1 di Plenvu

1. Bere la soluzione da 500 ml della Dose 1 di Plenvu nell'arco di 30 minuti. Cercare di bere un bicchiere pieno ogni 10 - 15 minuti.
2. Bere altri 500 ml di liquidi chiari nell'arco dei successivi 30 minuti. Acqua, brodo, sciroppi diluiti/succo di frutta chiaro (senza polpa), tisane, tè nero o caffè (senza latte) sono tutte bevande idonee.



**DOMUS
GRATIAE**
centro diagnostico

TERNI / via Ippocrate, 164
tel. 0744.221025
prenotazioni@cidatsanita.it



MURRI
diagnostica
fisio<ines>iterapia

TERNI / via Italo Calvino, 6
tel. 0744.427262
diagnosticamurri@gmail.com



**ORVIETO
DIAGNOSTICA**
centro medico polispecialistico

ORVIETO / via dell'Innovazione, 1A
tel. 0763.32521
orvietodiagnostica@cidatsanita.it



**CENTRO
ATTIVITÀ
MOTORIE**

fisioterapia – diagnostica
visite specialistiche

TERNI / Via del Modulo, 6
tel. 0744.304590
prenotazioni@centroattivitaemotorie3.it



**CENTRO
MEDICO
VALNERINA**

fisioterapia – diagnostica
visite specialistiche

ARRONE / Via Rimembranze, 59
tel. 0744.388626
centromedicovalnerina@cidatsanita.it

1. Quando è pronto a prendere la Dose 2, versare il contenuto della Bustina A e della Bustina B della Dose 2 in un recipiente graduato che possa contenere 500 ml di liquido.
2. Aggiungere acqua fino a raggiungere 500 ml e mescolare fino a che tutta la polvere sia disciolta. Questa operazione può richiedere fino a circa 8 minuti.

Come bere la Dose 2 di Plenvu

1. In base ai tempi prescritti dallo schema di dosaggio raccomandato, preparare e bere la soluzione da 500 ml della Dose 2 di Plenvu nell'arco di 30 minuti.
2. Bere altri 500 ml di liquidi chiari nell'arco dei successivi 30 minuti. Si possono bere altri liquidi chiari prima, durante e dopo l'assunzione di Plenvu, ma deve smettere di bere 1-2 ore prima dell'esame clinico. Bere liquidi chiari aiuterà a prevenire la perdita di liquidi (disidratazione).

Che cosa si deve aspettare che accada

Quando comincia a bere la soluzione Plenvu, è importante trovarsi vicino a un bagno. Ad un certo punto, comincerà ad avvertire movimenti di liquido nell'intestino. Ciò è del tutto normale e indica che la soluzione Plenvu sta agendo. Potrebbe avvertire gonfiore della zona gastrica prima del suo primo movimento intestinale.

Se segue queste istruzioni, l'intestino risulterà pulito e ciò favorirà l'esecuzione e la riuscita dell'esame. Dovrebbe avere il tempo necessario, dopo che i movimenti intestinali si siano calmati, per recarsi in clinica/ospedale.

Se prende più lassativi di quanto deve

Se prende Plenvu prima o dopo aver preso altri prodotti lassativi può avere un eccesso di diarrea, che può causarle disidratazione. Assuma abbondanti quantità di liquidi chiari. Se è preoccupato contatti il medico o si rechi immediatamente al più vicino pronto soccorso.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, Plenvu può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

È normale avere diarrea quando si assume Plenvu.



**DOMUS
GRATIAE**
centro diagnostico
TERNI / via Ippocrate, 164
tel. 0744.221025
prenotazioni@cidatsanita.it



MURRI
diagnostica
fisio/kinestera
TERNI / via Italo Calvino, 6
tel. 0744.427262
diagnosticamurri@gmail.com



**ORVIETO
DIAGNOSTICA**
centro medico polispecialistico
ORVIETO / via dell'Innovazione, 1A
tel. 0763.32521
orvietodiagnostica@cidatsanita.it



**CENTRO
ATTIVITÀ
MOTORIE**
fisioterapia - diagnostica
visite specialistiche
TERNI / Via del Modulo, 6
tel. 0744.304590
prenotazioni@centroattivitaemotorie3.it



**CENTRO
MEDICO
VALNERINA**
fisioterapia - diagnostica
visite specialistiche
ARRONE / Via Rimembranze, 59
tel. 0744.388626
centromedicovalnerina@cidatsanita.it

Se non avverte movimenti intestinali entro 6 ore dall'assunzione di Plenvu, **interrompa** l'assunzione e contatti immediatamente il medico.

Se avverte uno dei seguenti effetti indesiderati **interrompa** l'assunzione di Plenvu e contatti immediatamente il medico, poiché potrebbe trattarsi di sintomi di una grave reazione allergica:

- Eccessivo affaticamento
- Palpitazioni
- Eruzione cutanea o prurito
- Fiato corto
- Gonfiore del viso, delle caviglie o di altre parti del corpo

Contatti immediatamente il medico se avverte uno di questi sintomi durante l'assunzione di Plenvu, poiché potrebbe indicare una perdita eccessiva di fluidi corporei (disidratazione):

- Capogiri
- Cefalea
- Minzione meno frequente del normale
- Vomito

Inoltre, contatti immediatamente il medico se avverte forte dolore nella zona gastrica (addome).

Raramente possono verificarsi gravi problemi del ritmo cardiaco (ossia può avvertire il cuore battere forte, palpitare o battere irregolarmente, spesso per alcuni secondi o anche alcuni minuti) con l'uso di lassativi per preparazione intestinale, specialmente in pazienti che presentano patologie cardiache o squilibri salini. Contatti il medico se i sintomi persistono.

Effetti indesiderati comuni (possono interessare fino a 1 persona su 10):

- Disidratazione
- Nausea (sensazione di malessere)
- Vomito



**DOMUS
GRATIAE**
centro diagnostico
TERNI / via Ippocrate, 164
tel. 0744.221025
prenotazioni@cidatsanita.it



MURRI
diagnostica
fisio/inesiterapia
TERNI / via Italo Calvino, 6
tel. 0744.427262
diagnosticamurri@gmail.com



**ORVIETO
DIAGNOSTICA**
centro medico polispecialistico
ORVIETO / via dell'Innovazione, 1A
tel. 0763.32521
orvietodiagnostica@cidatsanita.it



**CENTRO
ATTIVITÀ
MOTORIE**
fisioterapia – diagnostica
visite specialistiche
TERNI / Via del Modulo, 6
tel. 0744.304590
prenotazioni@centroattivitaemotorie3.it



**CENTRO
MEDICO
VALNERINA**
fisioterapia – diagnostica
visite specialistiche
ARRONE / Via Rimembranze, 59
tel. 0744.388626
centromedicovalnerina@cidatsanita.it

Effetti indesiderati non comuni (possono interessare fino a 1 persona su 100):

- Gonfiore e dolore addominale
- Dolori e indolenzimenti
- Reazione allergica
- Brividi
- Affaticamento
- Cefalea o emicrania
- Vampate di calore
- Aumento del livello di glucosio nel sangue nei pazienti diabetici
- Aumento della frequenza cardiaca
- Palpitazioni
- Dolore anale
- Sonnolenza
- Aumento temporaneo della pressione sanguigna
- Aumento temporaneo degli enzimi epatici
- Sete
- Squilibri dei vari sali (elettroliti)
- Debolezza



**DOMUS
GRATIAE**
centro diagnostico

TERNI / via Ippocrate, 164
tel. 0744.221025
prenotazioni@cidatsanita.it



MURRI
diagnostica
fisio kinesiterapia

TERNI / via Italo Calvino, 6
tel. 0744.427262
diagnosticamurri@gmail.com



**ORVIETO
DIAGNOSTICA**
centro medico polispecialistico

ORVIETO / via dell'Innovazione, 1A
tel. 0763.32521
orvietodiagnostica@cidatsanita.it



**CENTRO
ATTIVITÀ
MOTORIE**

fisioterapia – diagnostica
visite specialistiche

TERNI / Via del Modulo, 6
tel. 0744.304590
prenotazioni@centroattivitaemotorie3.it



**CENTRO
MEDICO
VALNERINA**

fisioterapia – diagnostica
visite specialistiche

ARRONE / Via Rimembranze, 59
tel. 0744.388626
centromedicovalnerina@cidatsanita.it



**DOMUS
GRATIAE**
centro diagnostico

TERNI / via Ippocrate, 164
tel. 0744.221025
prenotazioni@cidatsanita.it



MURRI
diagnostica
fisio kinesiterapia

TERNI / via Italo Calvino, 6
tel. 0744.427262
diagnosticamurri@gmail.com



**ORVIETO
DIAGNOSTICA**
centro medico polispecialistico

ORVIETO / via dell'Innovazione, 1A
tel. 0763.32521
orvietodiagnostica@cidatsanita.it



**CENTRO
ATTIVITÀ
MOTORIE**

fisioterapia – diagnostica
visite specialistiche

TERNI / Via del Modulo, 6
tel. 0744.304590
prenotazioni@centroattivitaemotorie3.it



**CENTRO
MEDICO
VALNERINA**

fisioterapia – diagnostica
visite specialistiche

ARRONE / Via Rimembranze, 59
tel. 0744.388626
centromedicovalnerina@cidatsanita.it